

۳. چرا باید دو نوع داروی ضد انعقادی را

همزمان مصرف کنم؟

به دو روش متفاوت عمل می کنند. ترکیب همزمان عملکرد این دو دارو مانع از انعقاد خون و تشکیل لخته خواهد شد. این ترکیب باعث می شود که تشکیل لخته های خون که منجر به انسداد عروق می شود کاهش یابد. مصرف همزمان آسپرین و داروی ضد انعقاد تجویز شده بهترین راه محافظت در برابر لخته های خون است. مصرف همزمان این دو دارو برای عملکرد درست آنها بسیار مهم است.

۴. آیا مصرف همزمان پلاویکس و سایر داروهایی


که مصرف میکنم، عوارض خاصی به همراه

نخواهد داشت؟

حتماً پزشك متخصص قلب خود را از داروها، ویتامینها و سایر مکمل های دارویی که می خورید و یا تصمیم دارید در آینده مصرف کنید، مطلع نمایید و در مورد عوارض احتمالی مصرف همزمان آن داروها سوال کنید. به عنوان مثال استفاده از داروهای مسکن به همراه این داروها ممکن است عوارض گوارشی و ... ایجاد کند.

بعد از تعبیه استنت استفاده از این داروها بسیار حیاتی بوده زیرا مانع از لخته شدن و بسته شدن استنت می شود.

اگر پزشك دیگری، برای مثال دندانپزشکتان، شما را از مصرف این داروها منع کرد، حتماً قبل از توقف مصرف این داروها با پزشك متخصص قلبتان مشورت کنید.



۲. اگر خوردن يك وعده از داروی ضد انعقادی

را فراموش کردم، چه کنم؟

يك وعده از آسپرین یا پلاویکس را فراموش کردید، به محض اینکه این اتفاق را به خاطر آوردید دارویتان را مصرف کنید. هرگز سعی نکنید که با مصرف دوبرابر دارو در وعده بعدی (یا روز بعد) این فراموش کاری را جبران کنید.

پرسش هایی در مورد رژیم درمانی دارویی پس از عمل آنژیوپلاستی

توجه خیلی مهم :

مددجوی گرامی داروی پلاویکس یا اسویکس برای سلامتی شما خیلی مهم و مفید می باشد لطفاً در مصرف آن به هیچ عنوان سهل انگاری نکنید. حتی يك روز هم داروی فوق بدون نظر پزشك قطع نشود.

۱. اهمیت مصرف داروهای ضد انعقادی پس از

استنت گذاری در چیست؟

داروهای ضد انعقادی، که "ضد پلاکت" یا "رقیق کننده خون" نیز نامیده می شوند، احتمال حمله قلبی، سکته و مرگ را کاهش می دهند زیرا احتمال تشکیل لخته خون را کاهش میدهند. برای شما بسیار مهم است که بر اساس نسخه تجویز شده این داروها را مصرف کنید حتی وقتی که احساس می کنید حال عمومی تان بهتر شده است.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
آذربایجان غربی معاونت امور درمان
مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی
قلب و عروق سیدالشهداء (ع)



که

بروشور آموزشی شماره: ۴۲

عنوان بروشور: پرسش‌هایی در مورد رژیم
درمانی دارویی پس از عمل آنژیوپلاستی

منبع: داروهای ژنریک

تاریخ تهیه: آبان ماه ۱۳۹۲

۸. اگر مصرف داروهایم را متوقف کنم چه

اتفاقی می‌افتد؟

با اینکار شما احتمال ایجاد لخته درون استنت یا در
نواحی نزدیک به آن را افزایش خواهید داد. این لخته می
تواند باعث حمله قلبی، سکته یا حتی مرگ شود.

۹. اگر در اثر بریدگی دچار خونریزی شوم و یا

خون مردگی‌های وسیع در تنم ایجاد شود، آیا

باید مصرف داروی ضد انعقاد را متوقف کنم؟

خیر، قبل از هر تصمیمی با پزشک متخصص قلبتان
تماس بگیرید.

www.sshohada.umsu.ac.ir

۵. اگر یک پزشک متخصص قلب دیگر، یک

دندانپزشک یا یک داروساز دستور به توقف

مصرف داروی ضد انعقادی داد، چه کنم؟

مصرف داروی خود را قطع نکنید. بلافاصله به پزشک
متخصص قلب خود اطلاع دهید.

۶. آیا میتوانم میزان (دوز) مصرف داروی

پلاویکس را بعد از چند هفته یا چند ماه کاهش

دهم؟

ضروری است هرگز میزان مصرف دارو را خودسرانه
تغییر ندهید و یا استفاده از دارو را متوقف نکنید مگر
آنکه دستور مصرف جدیدی از پزشک متخصص قلبتان
داشته باشید.

۷. آیا وقتی حالم بهتر شد میتوانم مصرف

داروهایم را متوقف کنم؟

خیر، شما باید به مصرف روزانه داروهایتان بر اساس
دستور پزشک ادامه دهید حتی وقتی که احساس میکنید
حالتان بهتر شده است.